

AGGIORNAMENTO METEO: si segnala tempo instabile con precipitazioni sparse per tutto il week end che perdureranno fino a lunedì.

MELO-FIORITURA:



Ticchiolatura: considerando il peggioramento previsto per il fine settimana e la vegetazione scoperta si consiglia di rinnovare la copertura entro la giornata di oggi con prodotto base Dithianon (Delan 70 WG dose 800 gr/ 1 kg/ha) in alternativa prodotto base Fluazinam, attivo anche contro marciume calicino, (Ohayo-Banjo dose 1 kg/ha). Si ricorda che negli appezzamenti storicamente interessati da oidio è possibile utilizzare prodotto base Dithianon+Pyraclostrobin (Maccani dose 2,5 kg/ha) oppure prodotto base Penthiopyrad (Fontelis dose 1 kg/ha)

Oidio : nel caso in cui non si volesse intervenire con i prodotti sopra indicati ad azione antioidica si consiglia di aggiungere alla copertura prodotto specifico base Bupirimate (Nimrod dose 0,9 kg/ha) in alternativa prodotto base Cyflufenamide (Cidely/Rebel Top dose 0,5 kg/ha)

Diradamento chimico del melo

GRUPPO RED DELICIOUS :

Strategia	Epoca intervento	Principio attivo	Formulato commerciale	Dose (g-ml/l)	Dose kg/ha
	Bottoni rosa	Ethephon	Ethrel, ecc	30	0.45
Prova sperimentale estesa	8 – 10 mm	metamitron	Brevis	-	1.6 – 2

Linea tradizionale	Bottoni rosa	Ethephon	Ethrel, ecc	30	0.45
	oppure Fiore centrale fecondato	ATS*	Ger Ats (60 %) formulazione liquida	-	15
			ATS (90 %) formulazione in polvere	-	12
		5 - 7 mm	NAA	Nokad ecc	20

GRUPPO GALA :

Strategia	Epoca intervento	Principio attivo	Formulato commerciale	Dose (g-ml/hl)	Dose Kg/ha
Prova sperimentale estesa	Inizio caduta petali del fiore centrale sul legno vecchio	NAD	Amid Thin W, Diramid (8%)	100	1.5
			Geramid neu (4%)	170 - 200	2.5 - 3
	8-10 mm	metamitron	Brevis	-	2 - 2.2
Linea tradizionale	Inizio caduta petali del fiore centrale sul legno vecchio	NAD	Amid Thin (8%) ecc	100	1.5
	8-10 mm	6 - BA	Maxcel, Exilis, Gerbathin 2 LG (2%)	500	7.5
			Brancher Dirado, Agrimix top (9.4%), Separo	100	1.5
			Gerba 4 LG (4%)	250	3.75
		olio bianco o bagnanti	vari	100	-

GRUPPO GOLDEN DELICIOUS:

Fioritura	Epoca intervento	Principio attivo	Formulato commerciale	Dose (g-ml/hl)	Dose Kg/ha
Prova sperimentale estesa	Inizio caduta petali del fiore centrale sul legno vecchio	NAD	Amid Thin W, Diramid (8%)	100	1.5
			Geramid neu (4%)	170-200	2.5 - 3
	8-10 mm	metamitron	Brevis	-	2 - 2.2
Linea tradizionale	Inizio caduta petali del fiore centrale sul legno vecchio	NAD	Amid Thin W, Diramid (8%)	100	1.5
			Geramid neu (4%)	170-200	2.5 - 3
	10-12 mm	6 - BA	Maxcel, Exilis, Gerbathin 2 LG (2%)	500	7.5
			Brancher Dirado, Agrimix top (9.4%), Separo	100	1.5
			Gerba 4 LG (4%)	250	3.75
		olio bianco o bagnanti	vari	100	-

GRUPPO FUJI :

Strategia	Epoca intervento	Principio attivo	Formulato commerciale	Dose (g-ml/hl)	Dose Kg/ha
Linea sperimentale estesa 1	Inizio caduta petali del fiore centrale	Ethephon + ATS	Ethrel, ecc	30	0.45
			Ger Ats (60 %) formulazione liquida	-	15
			ATS (90 %) formulazione in polvere	-	12
	8-10 mm	metamitron	Brevis	-	2 - 2.2

*E-mail: anghilante@confagricuneo.it
Tel. 3421422203 Anghilante Nicolas*

Linea sperimentale estesa 2	8-10 mm	metamitron	Brevis	-	2 – 2.2
	12-14 mm	metamitron	Brevis	-	2 – 2.2

GRUPPO RENETTE

Strategia	Epoca intervento	Principio attivo	Formulato commerciale	Dose (g-ml/l)	Dose Kg/ha
Unica	Inizio caduta petali del fiore centrale sul legno vecchio	NAD	Amid Thin W, Diramid (8%)	100	1.5
			Geramid neu (4%)	170 - 200	2.5 - 3


ALBICOCCO – FRUTTICINI :



Monilia : in previsione delle piogge si consiglia l'intervento con prodotto base Cyprodinil (Chorus dose 0,450 kg/ha) oppure prodotto base Boscalid (Cantus,Filan dose 0,400 kg/ha) in alternativa prodotto base Cyprodinil+Fludioxonil (Switch dose 0,300 kg/ha) oppure Boscalid+Pyraclostrobin (Bellis Drupacee, Aragon dose 0,750 kg/ha) si ricorda che sono ammessi un massimo di 2 interventi all'anno per ciascun P.A. . Per la scelta del P.A. contattare il servizio tecnico.


Afidi : nel caso in cui si sia riscontrata la presenza di afidi si consiglia di intervenire **ESCLUSIVAMENTE** negli impianti distanti da melo o altre colture in fiore con prodotto base Imidacloprid (Confidor ,Kohinor dose 0,750 kg/ha) . Si ricorda che è possibile effettuare un unico trattamento all'anno con il prodotto sopra indicato.

PESCO – SCAMICIATURA:



Monilia-afidi : per chi trattato più di 15 gg fa , si consiglia di rinnovare la copertura, per la scelta del P.A. Contattare il servizio tecnico . **ESCLUSIVAMENTE** negli impianti isolati da melo in fioritura o altre colture in fiore si consiglia l'aggiunta di aficida specifico base Imidacloprid (Confidor/Kohinor dose 0,750 kg/ha).

ACTINIDIA – FOGLIE EMBRICATE



Batteriosi PSA : si ricorda che è possibile intervenire in questa fase con prodotto base Acibenzolar-s-metile (Bion 50 WG alla dose di 200 gr/ha) per una ripetizione di 2/3 interventi.

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:
Nicolas Anghilante Tel. 3421422203, anghilante@confagricuneo.it
Simone Monge Tel. 3460809796, monge@confagricuneo.it

*E-mail: anghilante@confagricuneo.it
Tel. 3421422203 Anghilante Nicolas*