



2015

19 giugno 2015

INFO NOCCIOLO n° 11

CReS 

Coordinamento Tecnici di base



 Piemonte Asprocor

AGGIORNAMENTO TECNICO

**Cimici e altri insetti: trattare
entro inizio prossima
settimana**

**Agrofarmaci: i nuovi
pittogrammi**



Maria Corte 335-8143030
Claudio Sonnati 334-6986914

Sezione Corilicoltura
CReSO - Centro di Ricerca e Sperimentazione per l'Ortofrutticoltura piemontese



2015

19 giugno 2015

INFO NOCCIOLA n° 11

CIMICI e ALTRI INSETTI: trattare entro inizio prossima settimana

Sulla base dei risultati dei *frappage* effettuati nelle zone indicate in tabella si consiglia:

Fase fenologica prevalente (Guida Frutticola CReSO)	Zona	Cimici/Balanino
 F- Ovario fecondato visibile  G -Accrescimento mandorla (fase 1)	Carrucese Fossanese	<p>SUPERAMENTO SOGLIA</p> <p>Effettuare il 1° trattamento insetticida, compatibile con le condizioni meteo, entro i primi giorni della prossima settimana con i p.a. riportati nella tabella successiva</p>
	Astigiano	<p>La disformità dei campionamenti nelle varie zone (Asti, Bubbio, Vesime, ecc.) suggerisce di attendere i monitoraggi di mercoledì 24 giugno. Il 1° trattamento è consigliato solo per le singole aziende dove si è superata la soglia.</p>
 E -Differenziazione nocciola  F- Ovario fecondato visibile	Alessandrino, Albese, Alta Langa	<p>Attendere gli esiti del prossimo monitoraggio</p>

Maria Corte 335-8143030

Claudio Sonnati 334-6986914

Sezione Corilicoltura

CReSO - Centro di Ricerca e Sperimentazione per l'Ortofrutticoltura piemontese



2015

19 giugno 2015

INFO NOCCIOLO n° 11

Estratto Disciplinari Difesa Nocciolo – Guida Frutticola CReSO 2015

EPOCA DI INTERVENTO	AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g- mL/hL	DOSE kg- L/ha	CARENZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
ACCRESIMENTO MANDORLA I (G)	BALANINO DEL NOCCIOLO (2)	DELTAMETRINA (2) (3)	DECIS JET	60-70	0,7-0,8	30	(2) Il Disciplinare di produzione integrata (PSR Piemonte) consente al massimo 2 trattamenti sul Balanino. (3) Su nocciolo al massimo previsti 2 interventi all'anno con piretroidi.
		BEAUVERIA BASSIANA (4)	NATURALIS BOVERAL (5)	400 - 600	2-3	0	(4) Il Disciplinare di produzione integrata (PSR Piemonte) dispone che l'impiego di Beauveria bassiana non deve essere compreso nel limite dei 2 interventi all'anno contro il Balanino. (5) Utilizzare preferibilmente con livelli di infestazione bassi. In base al clima ed all'infestazione, 3-5 applicazioni distanziate fra loro di 5-7 giorni.
		ETOFPENPROX (6) (7)	TREBON UP	50	0,75	14	Principio attivo registrato per contenere il Balanino, non indicato sull'avversità del Disciplinare di produzione integrata (PSR Piemonte). (6) Il Disciplinare di produzione integrata (PSR Piemonte) consente al massimo 3 trattamenti all'anno sulle cimici. (7) Tra Piretroidi ed Etofenprox al massimo 3 trattamenti all'anno indipendentemente dall'avversità.
		CHLORANTRANILIPROLE (RYNAXYPYR) (8)	CORAGEN	18 - 20	0,18 - 0,30	21	(2) Vedi nota relativa. (8) Sul PSR Piemonte previsti 2 interventi/anno. Consigliato nelle fasi fenologiche comprese fra l'allegagione e la maturazione (trattamenti durante l'ovideposizione, prima della schiusura delle prime uova).
ACCRESIMENTO MANDORLA II (H)	CIMICI (pentatomidi e coreidi)	LAMBDA-CIALOTRINA (3) (6) (7)	KARATE ZEON 1,5	170	1,7	7	(3) (6) (7) Vedi note relative.
		ETOFPENPROX (6) (7)	TREBON UP	50	0,75	14	(6) (7) Vedi note relative.
		ESTRATTI DI PIRETRO	ASSET, ESTEL	70-100	0,7-1	2	--
		INDOXACARB (9)	STEWARD	16,5	0,165	35	(9) Al massimo 1 trattamento all'anno; impiegabile solo contro Palomena prasina.

Per la distribuzione utilizzare volumi d'acqua compresi tra 900-1000 l/Ha (prove CReSO-Disafa 2014)

Maria Corte 335-8143030

Claudio Sonnati 334-6986914

Sezione Corilcoltura

CReSO - Centro di Ricerca e Sperimentazione per l'Ortofrutticoltura piemontese



2015

19 giugno 2015

INFO NOCCIOLO n° 11

La s.a. lambda cialotrina dimostra efficacia anche nei confronti degli adulti di agrilo i cui sfarfallamenti sono segnalati, in particolare nel carrucese e in alcune zone dell'astigiano.

Agrofarmaci: i nuovi pittogrammi

Il regolamento CLP (1272/2008) ha introdotto novità per il settore degli agrofarmaci con:

- ✓ nuovi criteri di classificazione;
- ✓ nuovi pittogrammi.

Prevede un periodo transitorio nel quale sono valide entrambe le versioni delle etichette agrofarmaci come indicato in tabella:

	1° giugno 2015	Periodo transitorio	1° giugno 2017
Prodotti messi In commercio prima del 1/06/2015	Valide entrambe le classificazioni (DPD e CLP)	Valide entrambe le classificazioni (DPD e CLP)	Valida classificazione CLP
Prodotti messi in commercio dopo 1/06/2015		Classificazione CLP	Classificazione CLP