

MELO-MATURAZIONE FRUTTI



Marciume da conservazione:

Considerando l'avanzamento della maturazione delle varietà del gruppo GALA le quali andranno probabilmente in raccolta verso la metà di agosto , per coloro che intendono utilizzare il p.a. Captano (Merpan 80 WDG doe 150 gr/hl) rispettare il tempo di carenza di giorni 21 . Si ricorda che la limitazione per questa sostanza attiva è di dodici interventi annui sommando i trattamenti base Dithianon e quelli base Captano.

Carpocapsa:

il modello matematico conferma la piena fase larvale in tutte le zone . Per quanto riguarda la strategia di difesa non sono necessari trattamenti specifici laddove vi sia presente la confusione. Nel caso di appezzamenti fuori confusione o negli appezzamenti ad alto rischio se il trattamento larvicida risale a più di 12 gg fa si consiglia di effettuare un ulteriore trattamento larvicida in questi giorni. Si ricorda che per quanto riguarda il p.a. Clorpirifos Metile (Reldan 22 etc.) causa condizioni climatiche particolari si consiglia l'utilizzo nelle ore meno calde della giornata e si sconsiglia la miscela con prodotti base P.A. Captano e prodotti a base di calcio.

Piralide:

Si segnala un aumento di catture sul mais mentre sui fruttiferi il volo del lepidottero risulta ancora ridotto . Per l'eventuale intervento ovo-larvicida attendere prossime indicazioni

PESCO PRE-RACCOLTA:



Monilia :

L'annata in corso è risultata poco favorevole allo sviluppo di questo patogeno, infatti nelle maggior parte degli impianti in raccolta si ha avuto un danno molto più contenuto rispetto alle annate

passate. Si consiglia comunque di continuare con i prodotti di copertura di pre raccolta rispettando SEMPRE i tempi di carenza. Per la scelta del P.A contattare il tecnico della struttura commerciale di riferimento.

Cydia Molesta :

In questa fase di accavallamento delle generazioni, causa il clima molto caldo ,si raccomanda di effettuare attenti monitoraggi in campo e in caso di riscontro di larve contattare il tecnico per la scelta del prodotto più adatto e con un tempo di carenza ristretto.

SUSINO – ACCRESCIMENTO FRUTTI

Cydia Funebrana :

Il modello matematico indica l'inizio della 3° generazione e la presenza delle prime uova nelle zone più anticipate . Per l'applicazione di prodotti larvicidi ed ovo-larvicidi attendere prossime indicazioni .

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:
Nicolas Anghilante Tel. 3421422203, anghilante@confagricuneo.it
Simone Monge Tel. 3460809796, monge@confagricuneo.it

*E-mail: anghilante@confagricuneo.it
Tel. 3421422203 Anghilante Nicolas*