



Unione Provinciale Agricoltori

Bollettino Bio frutticolo N° 3 -2017

Saluzzo, 27/05/2017

AGGIORNAMENTO METEO:

Le previsioni meteo indicano tempo stabile con assenza di precipitazioni e temperature ancora superiori alla media stagionale .

MELO –FRUTTICINO :



Ticchiolatura:

Si può dire che l'infezione primaria si sia conclusa, considerato quindi l'andamento climatico previsto per i prossimi giorni attualmente non sono necessari trattamenti

Oidio :

Annata particolarmente favorevole al patogeno, negli appezzamenti colpiti procedere con l'asportazione dei getti colpiti e continuare con la strategia di difesa .

Carpocapsa:

Il modello matematico conferma la fase larvale di 1° generazione in tutte le zone comprese le più tardive. Il volo del lepidottero è in aumento nelle trappole a caïromone e per il momento non si segnalano frutti colpiti. Per quanto riguarda la strategia di difesa continuare con l'applicazione del Virus della Granulosis in modo da mantenere i frutti protetti per l'intera fase larvale dell'insetto (Per info strategie contattare il servizio tecnico)

Cemïostoma

Il trattamento dedicato a base Spinosad è stato consigliato nei precedenti avvisi.

PERO–FRUTTICINO :




Ticchiolatura:

Vale quanto detto per melo

Carpocapsa:

Vale quanto detto per melo

PESCO-FRUTTICINI:



Cydia Molesta :

Il modello matematico a ritardo variabile indica l'inizio del volo in tutte le zone anche le più posticipate, per quanto riguarda la strategia di difesa attendere prossime indicazioni.

**Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:
Nicolas Anghilante Tel. 3421422203, anghilante@confagricuneo.it**

Tutti i diritti sono riservati. A termine di legge nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta con mezzi grafici o meccanici e/o inviata a terzi, senza il permesso scritto dello scrivente

*E-mail: anghilante@confagricuneo.it
Tel. 3421422203 Anghilante Nicolas*