



FEDERAZIONE COLTIVATORI
DIRETTI CUNEO



UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI CUNEO

COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA :

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
DOGLIANI, MONREGALESE

AVVISO N° 06
DEL
17.05.17

PERONOSPORA

Fase fenologica prevalente di pre.fioritura, ma si osservano situazioni con differenze amplificate, anche nello stesso vigneto, legate alla posizione altimetrica.

Nella giornata di venerdì 19 è previsto un breve passaggio temporalesco, seguito (visione odierna) da un veloce ripristino dell'alta pressione che dovrebbe garantire bel tempo per tutta la settimana prossima.

SI CONSIGLIA DI RINNOVARE LA COPERTURA DEI VIGNETI ENTRO GIOVEDÌ 18.5

utilizzando formulati commerciali di copertura a base di METIRAM, PROPINEB, DITHIANON O MANCOZEB (per questi ultimi due esiste limite di 3 trattamenti max/anno e 4 nel complesso includendo anche FOLPET), in associazione al citotropico CIMOXANIL oppure nelle situazioni più soggette un P.A. ENDOTERAPICO appartenente alla famiglia dei CAA: DIMETOMORF, IPROVALICARB, MANDIPROPAMIDE, BENTHIAVALICARB, VALIFENALATE (con questi 5 P.A., nel complesso, sono possibili al massimo 4 trattamenti/anno con l'avvertenza, dopo 3 consecutivi, di alternare, prima del quarto, un prodotto con P.A. di altra famiglia)

OIDIO

Nelle situazioni meno problematiche, associare ZOLFO BAGNABILE A DOSI MEDIE DI ETICHETTA
In vigneti/posizioni soggette è preferibile ricorrere all'associazione di prodotti contenenti P.A appartenenti alla **famiglia degli IBE**. La limitazione per essi, **nel complesso é di 3 trattamenti/anno...**

MA ATTENZIONE!!!!

Per **Fenbuconazolo, Penconazolo o Tetraconazolo** non ci sono ulteriori limiti, mentre per **ciproconazolo, difenoconazolo, miclobutanil propiconazolo, tebuconazolo (stessa famiglia IBE)** è consentito l'impiego per **UN solo trattamento l'anno, DI UNO SOLO** di questi principi attivi.