



FEDERAZIONE COLTIVATORI
DIRETTI CUNEO



UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI CUNEO

COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA :

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
LANGHE, ROERO

AVVISO N° 07
DEL
30.05.17

PERONOSPORA

Rapidissima progressione di Nebbiolo, barbera e pinot nero tra i rossi, arneis e chardonnay tra i bianchi, anche in posizioni medie, verso la chiusura della fioritura. Si conferma elevata disomogeneità. La diffusione della malattia è pressochè nulla, sfavorita dal decorso caldo e asciutto dell'ultima decade del mese in chiusura. E' però prevista probabile instabilità temporalesca in crescendo a partire da giovedì 1, fino ad almeno a lunedì 5 giugno.

SI CONSIGLIA DI RINNOVARE LA COPERTURA DEI VIGNETI APPENA POSSIBILE

Visto la delicatezza tutt'ora elevata della fase fenologica ricorrendo a formulati commerciali a base di AMETOCRADINA+ METIRAM o + FOSFONATO di K

MANCOZEB+METALAXIL-M

P.A appartenenti alla famiglia delle FENILAMMIDI: METALAXIL-(M) o BENALAXIL-(M)

PROPINEB+FLUOPICOLIDE

ZOXAMIDE+CIMOXANIL+FOSETYL-AL

oppure
oppure
oppure
oppure

ATTENZIONE! Ai seguenti limiti massimi /annui/ trattamenti:

2 per FLUOPICOLIDE

3 per AMETOCRADINA E CIMOXANIL

4 per ZOXAMIDE

5 per FOSFONATO di K

4 NEL COMPLESSO TRA MANCOZEB, DITHIANON, FOLPET, FLUZINAM,

3 In totale per il gruppo delle FENILAMMIDI, MA SOLO 1 SPECIFICAMENTE PER METALAXIL

ESISTE POI IL LIMITE TEMPORALE DELL'ALLEGAGIONE, PER MANCOZEB, METIRAM PROPINEB E DITHIANON

OIDIO

Ricorrere (o ripetere) all'associazione di prodotti contenenti P.A appartenenti alla **famiglia degli IBE**

La limitazione per questa famiglia numerosa di P.A, è **nel complesso di 3 trattamenti/anno...**

MA ATTENZIONE!!!!

Per **Fenbuconazolo, Penconazolo o Tetraconazolo** non ci sono ulteriori limiti,

mentre per **ciproconazolo, difenoconazolo, miclobutanil propiconazolo, tebuconazolo (stessa famiglia IBE)** è consentito l'impiego per **UN solo trattamento l'anno, DI UNO SOLO** tra quest'ultimi **5 principi attivi**.

UTILIZZARE PREFERIBILMENTE LE FORMULAZIONI COMBI (CON ZOLFO) DI QUESTI P.A, OPPURE, SE NON LO CONTENGONO GIÀ, AGGIUNGERE 2 KG/HA DI ZOLFO BAGNABILE COME PARTNER DI COPERTURA IN CHIAVE ANTIRESISTENZA