

Info n.13
Del 08/06/2017

NOCCIOLO



Coordinamento Tecnici di base

AGGIORNAMENTO TECNICO

CONTENIMENTO CIMICI DEL NOCCIOLO

Sezione corilicoltura
Maria Corte 335-8143030
Claudio Sonnati 334-6986914

CONTENIMENTO CIMICI DEL NOCCIOLO

Fase fenologica: differenziazione nocciola

I Campionamenti realizzati nelle zone corilicole dell'**Albese**, **Roero** e **Alta Langa**, hanno evidenziato che localmente le soglie di intervento per il contenimento delle cimici autoctone sono state raggiunte o superate e le femmine di *G. acuteangulatus* e *P. prasina* sono pronte alla deposizione delle uova.



In queste zone è venuto quindi il

momento di effettuare, **entro la fine di questa settimana, il primo trattamento insetticida** utilizzando formulati a base di **LAMBDAALOTRINA**.



Fig. 1 –Differenziazione nocciola

07 06 2017

PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Prima del trattamento sfalciare le erbe infestanti in fiore presenti nel nocciolo e sulle capezzagne.

Nella distribuzione in noccioli produttivi utilizzare non meno di 10 ettolitri di acqua per assicurare una completa bagnatura della vegetazione.

Per ottimizzare l'efficacia dei prodotti consigliamo di acidificare l'acqua portandola ad un Ph compreso fra 5,5-6,0.

PRECISAZIONE

In merito all'impiego dell'**ACETAMIPRID**, autorizzato in deroga su nocciolo da apposito Decreto del Ministero della Salute per situazioni di emergenza fitosanitaria per il controllo della Cimice asiatica e dal Settore Fitosanitario della Regione Piemonte per le aziende aderenti al P.S.R, si **specificeranno a breve** i tempi di distribuzione in base all'avvio della generazione estiva dell'insetto.