

Info n.18
Del 20/06/2017

NOCCIOLO



Coordinamento Tecnici di base

AGGIORNAMENTO TECNICO

CIMICI DEL NOCCIOLO: AREE DI INTERVENTO 2° TRATTAMENTO

Sezione corilicoltura
Maria Corte 335-8143030
Claudio Sonnati 334-6986914

CIMICI DEL NOCCIOLO: AREE DI INTERVENTO 2° TRATTAMENTO

Fase fenologica: accrescimento compreso fra le fenofasi F e G del fenogramma nocciòlo.



F: Ovario Fecondato Visibile



G: Accrescimento Mandorla

I Campionamenti realizzati nelle zone corilicole del **Carrucese, Fossanese, Monregalese, Saluzzese Cuneo e Comuni limitrofi** hanno evidenziato come **IN QUESTE ZONE** sia necessario **ESEGUIRE IL SECONDO TRATTAMENTO INSETTICIDA.**

Per questo intervento si consiglia la distribuzione del formulato commerciale **EPIK SL.**

In merito all'impiego dell'**ACETAMIPRID** si **precisa che è autorizzato n. 1 trattamento** in deroga su nocciòlo da apposito Decreto del Ministero della Salute per situazioni di emergenza fitosanitaria per il controllo della Cimice asiatica e dal Settore Fitosanitario della Regione Piemonte per le aziende aderenti al P.S.R.



PRECAUZIONI E AVVERTENZE

Eeguire l'intervento al tramonto inoltrato oppure nelle primissime ore del mattino.

Nella distribuzione in nocciòli produttivi utilizzare non meno di 10 ettolitri di acqua per assicurare una completa bagnatura della vegetazione.

Per ottimizzare l'efficacia dei prodotti consigliamo di acidificare l'acqua portandola ad un Ph compreso fra 5,5 - 6,0.