FEDERAZIONE COLTIVATORI DIRETTI CUNEO

Confederazione Italiana Agricoltori

UNIONE PROVINCIALE AGRICOLTORI CUNEO

COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA:

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10.1 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA **LANGHE, ROERO**	**AVVISO N° 10** DEL 06.07.17

Settimana scorsa gli apporti di pioggia, salvo eventi localizzati, sono stati piuttosto contenuti intorno ai 20 mm complessivi. Le temperature massime degli ultimi giorni si sono riportate prossime o sopra ai 35°C ed attualmente è previsto tempo stabile almeno fino a domenica. Non ci sono ad ora riscontri diffusi di stress idrico, ma in assenza di ulteriori apporti è probabile che non tarderanno a manifestarsi. I vitigni più precoci nelle zone meglio esposte, corrono verso un inizio dell'invaiatura precocissimo.

OIDIO

Intervenire trascorsi non più di 11-12 giorni dal precedente trattamento orientativamente. In caso di assenza di riscontri di attacchi proseguire la difesa con ZOLFO BAGNABILE, a dosi medie di etichetta.
Diversamente, ove ci siano problemi, si consiglia ancora un intervento con fungicidi specifici a base di CYFLUFENAMID oppure METRAFENONE (con limite massimo di 3 trattamenti/anno con metrafenone, e 2 trattamenti/anno per cyflufenamid) oppure AZOXISTROBIN, TRIFLOXISTROBIN, PIRACLOSTROBYN (tutti famiglia QOI, assieme agli antiperonosporici fenamidone e famoxadone:max 3 trattamenti/anno nel complesso) oppure SPIROXAMINA (3 trattamenti/anno massimo)
L'alternanza tra questi principi attivi, nonché la cura nei dettagli della distribuzione e la tempistica sono altresì fattori complementari determinanti per l'esito della difesa da questa avversità.

PERONOSPORA

La pressione del patogeno è assolutamente contenuta in vigneti correttamente trattati. Si consiglia comunque di ripristinare la copertura della vegetazione, soprattutto per preservare le femminelle, ASSOCIANDO PRODOTTI RAMEICI preferibilmente a maggior persistenza (quali ossicloruri/solfato tribasico).
L'aggiunta di principi attivi sistemici a base di FOSETYL-AL oppure FOSFONATO DI POTASSIO (5 trattamenti/max), oppure DIFOSFONATO DISODICO (6 trattamenti/max) è indicata a tale scopo ne vigneti più vigorosi dei fondovalle.