



FEDERAZIONE COLTIVATORI  
DIRETTI CUNEO



UNIONE PROVINCIALE  
AGRICOLTORI CUNEO

COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA :

## DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10.1 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA  
LANGHE, ROERO, DOGLIANESE E  
MONREGALESE

**AVVISO N° 11.bis**  
DEL  
24.07.17

**Il SECONDO trattamento obbligatorio per le aziende convenzionali**  
**(che non hanno già impiegato in precedenza buprofezin)**  
**dovrà essere effettuato**  
**tra il 24 ed il 29 LUGLIO\***

CON UNO DEI SEGUENTI INSETTICIDI CONSIGLIATI ORA:

Sostanza attiva	Gruppo chimico	Intervallo di sicurezza (gg)
Acetamiprid	Neonicotinoidi	14
Thiamethoxam	Neonicotinoidi	21
Clorpirifos etile**	Fosfororganici	30
Clorpirifos metile	Fosfororganici	15
Etofenprox	Fenossibenzil eteri	14

**NOTA: PER IL PROSSIMO INTERVENTO SARA' NECESSARIO UTILIZZARE UN P.A. DIVERSO DA QUELLO IMPIEGATO PER QUESTO TRATTAMENTO.**

**La Flavescenza dorata della vite si previene solo se:**  
**dopo aver trattato con l'insetticida e trascorso il tempo di rientro**  
**(almeno 48 ore)**  
**si estirpano le piante IMMEDIATAMENTE malate**  
**e si eliminano i tralci con sintomi: questo serve per togliere la fonte di**  
**fitoplasma che rende infettivo l'insetto vettore (scafoideo).**

\*Occorre trattare nei primi giorni del periodo previsto nelle zone più calde e meglio esposte. \*\*Negli ultimi giorni del periodo nelle zone più fresche e dunque più tardive. In questo caso **NON** utilizzare clorpirifos etile.

**Verificare date specifiche per comuni rientranti in progetti pilota**