



Unione Provinciale Agricoltori

Bollettino Bio frutticolo N 5 ° -2018

Saluzzo, 08/03/2018

PERO-GEMMA D'INVERNO



Psilla :

Nelle zone più a rischio e negli appezzamenti storicamente interessati si consiglia di iniziare nei prossimi giorni con l'applicazione del 1° intervento a base di caolino prima dell'inizio del volo di 1° generazione . La dose d'impiego è di 3 KG/HL (dose minima 30-35 kg/ha) e va ripetuto non appena si nota la diminuzione dell'imbiancatura sulla pianta.

PESCO – GEMME GONFIA



Bolla del pesco :

Vista l'alta sensibilità al patogeno in questa fase si consiglia nelle zone più anticipate di programmare un intervento prima delle piogge previste con prodotti rameici (poltiglia disperss dose 300 gr/hl) oppure con polisolfuro di calcio dose 1,5-2 kg/hl.

ACTINIDIA – GEMMA D'INVERNO



Psa-Batteriosi dell'Actinidia

Se non si è già eseguito l'intervento dopo la potatura si consiglia di effettuare una copertura rameica prima delle piogge previste (poltiglia bordolese 500 gr/hl)

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo al seguente recapito:
Nicolas Anghilante Tel. 3421422203, anghilante@confagricuneo.it