



FEDERAZIONE COLTIVATORI  
DIRETTI CUNEO



COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA RELATIVO A :

## **DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA**

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10 DEL PSR)

**CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA  
LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE**

**AVVISO N° 1  
DEL  
27.04.18**

*SI E' CHIUSO IL FINALE DI INVERNO-INIZIO PRIMAVERA PROBABILMENTE PIU'FREDDO DEGLI ULTIMI VENT'ANNI. A META' DI APRILE IL RITARDO DELLA RIPRESA VEGETATIVA ERA STIMABILE OLTRE I 10 GIORNI. IN SEGUITO, CON LA RIPRESA DELLE TEMPERATURE E LA DISPONIBILITA' IDRICA, I GERMOGLI HANNO RIPRESO A CRESCERE AD UNA VELOCITA' IMPRESSIONANTE, RIDIMENSIONANDO TALE RITARDO, ATTUALMENTE A CIRCA 1 SETTIMANA. I NEBBIOLI MOSTRANO UNO SVILUPPO MEDIO DI 30 cm E LA RECETTIVITA' ALLA PERONOSPORA E' RAGGIUNTA O PROSSIMA PRESSOCHE' OVUNQUE.*

E'prevista una fase instabile con **PREVISIONI ANCORA ASSOLUTAMENTE INCERTE** (soprattutto su settimana prossima). Le piogge più consistenti attualmente sono indicate per venerdì prossimo.

### **PERONOSPORA**

Si consiglia di effettuare il primo trattamento tra **SABATO E LUNEDI 30 APRILE** utilizzando formulati commerciali a base di RAME o METIRAM o PROPINEB o DITHIANON o MANCOZEB PREFERIBILMENTE ASSOCIATI A CIMOXANIL, seguendo attentamente l'evoluzione meteo.

### **OIDIO**

Le condizioni sono favorevoli allo sviluppo del patogeno, onde la necessità prioritaria di intervenire comunque in chiave antiodica. Associare ZOLFO BAGNABILE, preferibilmente in formulazione liquida (più resistente al dilavamento), o, nei casi di vigneti/posizioni notoriamente sensibili ad attacchi, formulati a base di SPIROXAMINA.

In caso di dubbio, e vista la forte instabilità contattare il proprio tecnico per ulteriori indicazioni.