

**Info n. 04**

**Del 27/04/2018**



**Coordinamento Corilicolo Piemontese**

**AGGIORNAMENTO TECNICO**

**ERIOFIDE: ripetere trattamenti in tutte le zone**

**DISSECCAMENTI PRIMAVERILI: al più presto taglio di risanamento**

**TREBON UP: modificata dell'etichetta**

## **ERIOFIDE: ripetere trattamenti in tutte le zone**

Dai rilievi effettuati in campo risulta che molte galle siano ancora in fase di apertura con eriofide in attiva migrazione. Si consiglia pertanto in tutte le zone di ripetere l'intervento di contenimento con i p.a. indicati nella nota precedente al termine del periodo di instabilità previsto sul finire di questa settimana.

Nota: in considerazione dell'attuale abbondante fioritura nell'interfila si raccomanda di provvedere allo sfalcio prima di effettuare qualunque intervento.

## **DISSECCAMENTI PRIMAVERILI: al più presto taglio di risanamento**

In questi giorni, così come nella scorsa annata agraria, vengono segnalati casi di piante di nocciolo che manifestano una vegetazione stentata oppure pertiche completamente defogiate o già disseccate in alcuni casi con presenza di amenti secchi non fioriti tenacemente uniti alle stesse. Scortecciando una porzione di legno colpita si nota che è completamente disidratata compresa quella del cambio.



Si tratta di una fisiopatia che indifferentemente interessa gli impianti mono e policaule (alberello, vaso cespugliato e cespuglio) fino al decimo - dodicesimo



anno di età che si manifesta in seguito al succedersi di stagioni caratterizzate da andamenti climatici opposti (inverni freddi e piovosi che succedono a estati calde e siccitose o viceversa) o nelle annate successive a stagioni caratterizzate da elevata produzione.

Per rimediare a questa situazione bisognerà purtroppo tagliare alla base le pertiche e/o la pianta colpita ed allevare uno o più polloni in sostituzione di quelli deperiti. Le pertiche e/o le piante che presentano una vegetazione stentata,

foglie accartocciate e di dimensioni inferiori a quelle presenti su piante sane devono ESSERE TAGLIATE e RINNOVATE in quanto il controllo sulla funzionalità del legno indicato in precedenza (scortecciatura e valutazione del grado di

**idratazione della linfa) conferma che la circolazione linfatica è minima ma nella maggioranza dei casi totalmente assente.**

Per entrambi i casi citati occorre



ribadire che è necessario “SOSTITUIRE” le pertiche o l’astone disseccato e “NON RACCORCIARLO” perché la ripresa vegetativa, quando si verifica, è stentata e si esaurisce nell’arco di un biennio. Anche in questo caso **NESSUN TIPO DI CONCIMAZIONE FOGLIARE** o al **TERRENO** risolve questa fisiopatìa.



### **TREBON UP: modificata dell’etichetta**

Si informa che l’etichetta del formulato TREBON UP con Decreto Dirigenziale del Ministero della Salute datato 24 aprile 2018, per quanto riguarda la coltura del nocciòlo, è stata modificata come segue: “FITOFAGI : “Cimici (G. acuteangulatus, N. viridula, P. prasina, Halyomorpha halys), Balanino (C. nucum)”.