



Unione Provinciale Agricoltori

Bollettino Bio frutticolo N 11°-2018

Saluzzo, 04/06/2018

AGGIORNAMENTO METEO : si segnala ancora tempo instabile per l'inizio settimana con miglioramento a partire dalla giornata di giovedì.

MELO-ACCRESIMENTO FRUTTICINO



Ticchiolatura : Vista la situazione ancora instabile per inizio prossima settimana si consiglia di mantenere la vegetazione adeguatamente protetta con prodotti base rame + zolfo. Si RACCOMANDA di effettuare attenti monitoraggi all'interno dei propri frutteti al fine di individuare la presenza di macchie ed in caso di riscontro contattare il servizio tecnico al fine di individuare la corretta strategia contenitiva.

Colpo di fuoco batterico: sono giunte molteplici segnalazioni di getti colpiti da Erwinia pertanto, si raccomanda di porre la massima attenzione al fine di individuare i sintomi e procedere immediatamente all'asportazione delle parti colpite. Si ricorda che è di fondamentale importanza disinfettare le forbici dopo ogni taglio in modo da evitare un'ulteriore diffusione della malattia.

Carpocapsa : il modello previsionale indica per tutte le zone la fase larvale dell'insetto. Pertanto si consiglia di continuare con le applicazioni dei prodotti base Virus Della Granulosa a cadenza di 6-8 gg a seconda del formulato commerciale.

Cemistoma : si è raggiunta ormai la fase di schiusura uova pertanto si raccomanda negli appezzamenti storicamente a rischio di programmare intervento con Spinosad.

PERO- ACCRESIMENTO FRUTTICINO



Ticchiolatura : vedi melo


Maculatura Bruna : condizioni altamente favorevoli al patogeno pertanto si raccomanda di mantenere adeguatamente protetta la vegetazione.

Colpo di fuoco batterico: vedi melo

Carpocapsa : vedi melo

Psilla : si segnala la presenza delle neanidi di 1° generazione e le prime melate. In questi casi si raccomanda di procedere con i lavaggi

PESCO-ACCRESIMENTO FRUTTO



Monilia Fructicola : considerando l'andamento climatico dell'ultimo periodo e del periodo avvenire si consiglia di programmare alla fase di frutto noce l'applicazione di prodotti base zolfo al fine di mantenere il frutto protetto.

Miridi : da questa fase si consiglia di procedere allo sfalcio a file alterne all'interno dei pescheti al fine di favorire la permanenza dell'insetto nel cotico erboso inter-fila.

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo al seguente recapito:
Nicolas Anghilante Tel. 3421422203, anghilante@confagricuneo.it

Tutti i diritti sono riservati. A termine di legge nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta con mezzi grafici o meccanici e/o inviata a terzi, senza il permesso scritto dello scrivente

*E-mail: anghilante@confagricuneo.it
Tel. 3421422203 Anghilante Nicolas*