



FEDERAZIONE COLTIVATORI
DIRETTI CUNEO



COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA RELATIVO A :

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELL'OPERAZIONE 10.1.1 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE

AVVISO N° 6
01.06.18

FASE FENOLOGICA ESTREMAMENTE VARIABILE PER VITIGNO/ZONA/POSIZIONE ALTIMETRICA: DA PIENA FIORITURA/ INIZIO ALLEGAGIONE SU NEBBIOLO A PRE-FIORITURA ANCORA SU DOLCETTI Più TARDIVI E MOSCATO

PERONOSPORA

SI OSSERVA UN INCREMENTO DEI RISCONTRI DI MACCHIE D'OLIO ASSOCIATE ANCHE A RISCONTRI DI INFEZIONI (NON FREQUENTISSIME) SULLE INFIORESCENZE. APPORTI TEMPORALESCHI DA LUNEDÌ 28.5 VARIABILI DAI 40 AI 70 mm. DA LUNEDÌ 4 GIUGNO È PREVISTA, COME DA COPIONE, UNA NUOVA ONDATA TEMPORALESCA INTENSA PER DURANTE PER TUTTA LA SETTIMANA PROSSIMA. LE PREVISIONI A MEDIO TERMINE CONFERMANO -ATTUALMENTE- UN MOLTO PROBABILE PER DURARE DELL'INSTABILITÀ FINO ALLA META' DI GIUGNO

CON QUESTO QUADRO IL RISCHIO POTENZIALE RESTA ELEVATISSIMO!

SI CONSIGLIA NUOVAMENTE DI RIPRISTINARE LA PROTEZIONE PIENA DELLA VEGETAZIONE ENTRO DOMENICA 3 GIUGNO, NELL'IMPOSSIBILITÀ (VEROSIMILE) DI NON POTER INTERVENIRE/FARLO MALE PER TUTTA LA SETTIMANA PROSSIMA

Si consiglia di utilizzare a scelta una dei formulati commerciali seguenti **TENENDO BEN PRESENTE LE LIMITAZIONI INDICATE CHE VALGONO SIA PER I PRODOTTI SINGOLI, SIA QUANDO COMPAGNONO COME PARTNER IN ASSOCIAZIONE AD ALTRI PA AMETOCTRADINA+ Più METIRAM (CON AMETOCTRADINA MAX 3 TRATTAMENTI/ANNO) oppure METALAXIL/ METALAXIL-M/BENALAXIL- BENALAXIL-M (gruppo FENILAMMIDI: MAX 3 TRATTAMENTI ANNO MA UNO SOLO CON METALAXIL) oppure FLUOPICOLIDE+PROPRINEB (CON FLUOPICOLIDE MAX 2 TRATTAMENTI/ANNO) oppure, molto indicata la LA MISCELA DEL NUOVO OXATHIOPROLIN + FOLPET O ZOXAMIDE, OPPURE AMISULBRON + UN P.A DI COPERTURA o ZOXAMIDE (MAX 4 TRATTAMENTI/ANNO) METIRAM o PROPINEB o DITHIANON o MANCOZEB o FOLPET SCELTA****

****ATTENZIONE! MASSIMO 4 TRATT/ANNO NEL COMPLESSO TRA FOLPET, MANCOZEB, DITHIANON E FLUAZINAM. INOLTRE NESSUNO DI ESSI PUO' ESSERE UTILIZZATO Più DI TRE VOLTE AL MASSIMO**

OIDIO/BOTRITE (RISCHIO ELEVATISSIMO)

Associare, uno dei seguenti p.a appartenenti alla famiglia degli IBE: Fenbuconazolo, Penconazolo o Tetraconazolo oppure, **ciproconazolo, difenoconazolo, flutriafol, miclobutanil, propiconazolo, tebuconazolo: Attenzione!!!** La limitazione per gli IBE, **nel complesso é di 3 trattamenti/anno ma è consentito l'impiego per UN solo trattamento l'anno, DI UNO SOLO degli ultimi 6 riportati in grassetto.**

L'associazione di questi ultimi -se non già in formulazione combi- con ZOLFO BAGNABILE è ottima cosa anche in ottica di strategia antiresistenza. **IN CHIAVE ANTIBOTRITICA SONO INDICATI:**

BOSCALID (1 solo trattamento, ma massimo 2 trattamenti/anno complessivi con FLUXAPYROXAD)

Oppure TRIFLOXYSTROBIN (GRUPPO QOI ASSIEME AD ZOXISTROBIN E PIRACLOSTROBYN: MAX 3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/ANNO) oppure specificamente per zone/vitigni prossimi all'allegagione:

BUPIMIRATE oppure CYFLUFENAMID oppure METRAFENONE (limite massimo trattamenti/anno per metrafenone: 3. Per cyflufenamid e bupimirate: 2)

ANTIBOTRITICI SPECIFICI INDICATI PER LA PIENA FIORITURA: EUGENIOLO+GERANIOLO+TIMOLO, oppure Bacillus subtilis

In ogni caso di dubbio, vista la complessità operativa, contattare il proprio tecnico per ulteriori indicazioni

SI RICORDA ALLE AZIENDE ADERENTI ALLA MISURA 10.1.1 L'OBBLIGO DI SFALCIO ERBA A FILARI ALTERNI.