



FEDERAZIONE COLTIVATORI
DIRETTI CUNEO



COMUNICATO PER LA DIFESA IN VITICOLTURA RELATIVO A:

DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA

(VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELL'OPERAZIONE 10.1.1 DEL PSR)

CENTRO DI ASSISTENZA TECNICA
LANGHE, ROERO, DOGLIANI, MONREGALESE

AVVISO N° 7
08.06.18

FASE FENOLOGICA DA GRANO PEPE SU NEBBIOLO A INIZIO-PIENA FIORITURA SU DOLCETTO/MOSCATO PIU' TARDIVI

PERONOSPORA

NON ABBASSARE LA GUARDIA!

LA PRESSIONE ESTERNA AI VIGNETI BEN TRATTATI (QUELLA SU TESTIMONI/INCOLTI/ VIGNETI POCO TRATTATI ANCHE PER DIFFICOLTA' OPERATIVE) DA INIZIO SETTIMANA E' IN FORTE AUMENTO, CON ATTTACCHI FREQUENTI ANCHE SUI GRAPPOLINI NEO-FORMATI. QUESTO E' UN SEGNALE DA NON TRASCURARE METEO: ANCORA DA COPIONE CHE SI RIPETE: ASCIUTTO NEL FINE SETTIMANA FINO A DOMENICA, POI NUOVA ONDA TEMPORALESCA CHE IN UN PRIMO MOMENTO SEMBRAVA SOLO SU LUNEDI-MARTEDI, ORA PARE CHE SI PROTRAGGA TUTTA LA SETTIMANA (LE PREVISIONI DI INSTABILITA' PERDURANTE QUEST'ANNO SONO STATE -PURTROPPPO- AZZECCATE)

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE UN NUOVO TRATTAMENTO ENTRO DOMENICA 10 GIUGNO

ATTENZIONE, NELLA SCELTA DEI PRODOTTI, AL RISPETTO DEI SEGUENTI LIMITI

- ***TRA FOLPET, MANCOZEB, DITHIANON E FLUAZINAM: MASSIMO 4 TRATTAMENTI/ANNO. OGNUNO DI ESSI MAX 3 VOLTE/ANNO. MANCOZEB, DITHIANO E PROPINEB SONO UTILIZZABILI SOLO FINO ALL'ALLEGAGIONE.
- *AMETOTCRATIDA E CIMOXANIL: MAX 3 V/ANNO CIASCUNA
- *P.A DEL GRUPPO CAA NEL COMPLESSO- MAX 4 TRATT/ANNO (DOPO LA TERZA OBBLIGO INTERVALLARE CON P.A DI DIVERSA FAMIGLIA)
- *ZOXAMIDE: MAX 4/VOLTE ANNO
- *PA DEL GRUPPO FENILAMMIDI NEL COMPLESSO: MAX 3 TRATT/ANNO (MA SOLO 1 PER METALAXIL)
- *AMISULBRON E CIAZOFAMIDE: MAX 3 TRATT/ANNO NEL COMPLESSO
- *FLUOPICOLODE: MAX 2 TRATT/ANNO
- *FOSFONATO DISODICO: MAX 6 TRATT/ANNO
- *FOSFONATO DI POTASSIO: MAX 5 TRATT/ANNO
- *NEL COMPLESSO GRUPPO QOI: FAMOXADONE-FENAMIDONE(ANTIPERONOSPORICI) E.PYRACLOSTROBIN-AZOXYSTROBIN-TRIFLOXYSTROBIN (ANTIOIDICI): MAX 3 TRATT/ANNO

Utilizzare un prodotto a scelta tra AMETOCTRADINA+METIRAM oppure FENILAMMIDI: METALAXIL/ METALAXIL-M/BENALAXIL-BENALAXIL-M ANCHE ASSOCIATI A RAMEICI oppure indicata la MISCELA DEL NUOVO OXATHIOPIPROLIN+ZOXAMIDE o + FOLPET OPPURE AMISULBRON (Leimay) + UN P.A DI COPERTURA a SCELTA TRA METIRAM o PROPINEB o DITHIANON o MANCOZEB o FOLPET** o + ZOXAMIDE (MAX 4 TRATTAMENTI/ANNO) oppure CIAZOFAMIDE+FOSFONATO DI SODIO

I LIMITI SOPRA INDICATI VALGONO SIA PER IL PRODOTTO CHE CONTIENE IL SINGOLO PA CHE QUANDO ESSO RIENTRA IN MISCELA CON ALTRI PARTNER

OIDIO/BOTRITE/BLACK ROT (RISCHIO ELEVATO)

ALTERNARE! uno dei seguenti p.a appartenenti alla famiglia degli IBE: Fenbuconazolo, Penconazolo o Tetraconazolo oppure, ciproconazolo, difenoconazolo, flutriafol, miclobutanil, propiconazolo, tebuconazolo: **Attenzione!!!** La limitazione per gli IBE, nel complesso è di 3 tratt/anno ma è consentito l'impiego per UN solo trattamento l'anno, DI UNO SOLO degli ultimi 6 riportati in grassetto.

Associare a questi ultimi -se non già in formulazione combi- ZOLFO BAGNABILE anche in strategia antiresistenza.

A TRIFLOXYSTROBIN (GRUPPO QOI: max 3 tratt nel complesso, come sopra specificato, oppure specificamente per zone/vitigni prossimi nettamente oltre l'allegazione: BUPIMIRATE oppure CYFLUFENAMID oppure METRAFENONE (limite massimo 3 tratt/anno per Metrafenone. 2 tratt/anno per Cyflufenamid e Bupimirate)

In ogni caso di dubbio, vista la complessità operativa, contattare il proprio tecnico per ulteriori indicazioni

TUTTE LE INDICAZIONI CONTENUTE NEI BOLLETTINI SUI PRINCIPI ATTIVI DEI PRODOTTI, AVVERSITA' VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI E DOSAGGI DEGLI STESSI,

SONO SEMPRE DA VERIFICARE.

INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE è LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITA' ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITA' TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE)