



Unione Provinciale Agricoltori

Bollettino Bio frutticolo N 16-2018

Saluzzo, 31/07/2018

MELO-ACCRESIMENTO FRUTTO



Ticchiolatura : laddove siano presenti infezioni secondarie mantenere i frutti e la vegetazione coperta in funzione delle previsioni meteo (Bicarbonato di Potassio o Olio essenziale di arancio) date le alte temperature evitare l'impiego di prodotti a base zolfo.

Carpocapsa : il modello matematico indica la piena fase larvale di 2° generazione in tutte le zone con aumento del volo . Attualmente non sono necessari trattamenti specifici si raccomanda di monitorare attentamente i propri frutteti al fine di individuare eventuali problematiche.

Eulia : attualmente si è nella fase di passaggio dalla 2° alla 3° generazione. Non sono necessari trattamenti.

Piralide : attualmente le trappole non hanno registrato ancora catture quindi attendere per trattamento con larvicida. Si raccomanda in questa fase di mantenere il sottofila pulito dalle malerbe in modo particolare dal giavone. Ù

Afide Lanigero : continua la parassitizzazione da parte dell'Aphelinus Mali il quale sta controllando il lanigero senza dover attualmente intervenire.


PERO- ACCRESIMENTO FRUTTO



Carpocapsa : il modello matematico indica la piena fase larvale di 2° generazione in tutte le zone con aumento del volo . Attualmente non sono necessari trattamenti specifici si raccomanda di monitorare attentamente i propri frutteti al fine di individuare eventuali problematiche.

Cydia Molesta : su varietà più prossime alla raccolta (William) si raccomanda di monitorare i frutteti al fine di individuare del bacato ed in caso di riscontro contattare immediatamente il servizio tecnico.

PESCO-PRE RACCOLTA



Marciumi di pre-raccolta : si consiglia nella fase di pre raccolta di ridurre al minimo l'irrigazione e di mantenere i frutti coperti con prodotto tipo Bacillus Subtilis (Serenade max) , Bacillus Amyloliquefaciens (Amylo-X) , Bicarbonato di potassio (Armicarb,Karma,Vitikappa).

*E-mail: anghilante@confagricuneo.it
Tel. 3421422203 Anghilante Nicolas*

Tripide estivo : si consiglia di mantenere una adeguata copertura anche tra gli stacchi (SPINOSAD ecc...)

Anarsia Lineatella : si consiglia negli appezzamenti storicamente a rischio e dove presenza di danno di effettuare un intervento base Bacillus Thuringensis anche tra gli stacchi .

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo al seguente recapito:
Nicolas Anghilante Tel. 3421422203, anghilante@confagricuneo.it

Tutti i diritti sono riservati. A termine di legge nessuna parte di questa pubblicazione può essere riprodotta con mezzi grafici o meccanici e/o inviata a terzi, senza il permesso scritto dello scrivente

*E-mail: anghilante@confagricuneo.it
Tel. 3421422203 Anghilante Nicolas*