

Info n. 18

Del 19/07/2018



Coordinamento Corilicolo Piemontese

AGGIORNAMENTO TECNICO

Trappole: catture adulti sempre basse e presenza neanidi

Cimici del nocciolo: poche catture alla ripresa dei campionamenti

Batteriosi: continuano segnalazione sintomi in areale corilicolo

Grandine: zone colpite e danni

Fase fenologica: in tutte le zone ci troviamo nella fase compresa tra accrescimento e definizione mandorla.

Trappole

In quasi tutte le zone oggetto di monitoraggio, anche per questa settimana, le catture di adulti di cimice asiatica sono in riduzione o in azzeramento in alcune postazioni. Si segnala anche la presenza di neanidi.

Solo nel canavese e nel chierese, le catture restano più consistenti rispetto alle altre zone, anche se in riduzione rispetto alle precedenti letture.

Si ricorda che i fermononi attrattivi (tutti i modelli) hanno una durata di 120 gg. e pertanto è importante, in base all'epoca di posizionamento in trappola, provvedere pr tempo alla sostituzione.

Frappage

In seguito all'esecuzione dell'intervento insetticida consigliato nei precedenti avvisi, si segnala la riduzione di catture nelle aziende ove sono stati eseguiti i frappage in questa settimana.

Solo in realtà dove, a tutt'ora, non è ancora stato effettuato alcun intervento, le catture di cimici del nocciolo sono consistenti e per queste aziende occorrerà non tardare nell'effettuazione dello stesso.

Nell'ambito del coordinamento si è avviata l'analisi dei dati relativi all'uscita dalla diapausa (scatole di svernamento) delle cimici asiatiche per stabilire la causa della riduzione delle popolazioni sia nei siti di svernamento che nelle scatole.

Vista la generale situazione di scarsità di catture si consiglia di **PROSEGUIRE** anche in questa settimana **NEI FRAPPAGE PER FOTOGRAFARE LOCALMENTE LA SITUAZIONE.**

BATTERIOSI:SEGNALAZIONE ATTACCHI DIFFUSI

Proseguono le segnalazioni di attacchi consistenti di batteriosi su nocciolo. L'annata è particolarmente favorevole alla diffusione dell'infezione e sarà quindi necessario proseguire nella profilassi di contenimento del parassita anche nel periodo estivo prevedendo l'impiego di formulati a base di rame.

GRANDINE

Si segnalano danni considerevoli, anche in nocciolo, in alcune zone (Carrù, Piozzo, Dogliani) flagellate da violente grandinate negli scorsi giorni. I tecnici stanno accertando l'entità dei danni a carico del legno e dei frutti in maturazione. Al fine di prevenire eventuali futuri attacchi fungini, si consiglia di intervenire con una miscela di rame +zolfo per disinfettare le ferite e favorire la cicatrizzazione del legno.