

**Info n. 02**  
**Del 14/03/2019**

**NOCCIÒLO**



**Coordinamento Corilicolo Piemontese**

## AGGIORNAMENTO TECNICO

**Clima e fasi fenologiche localmente riscontrate**

**Cocciniglia (*Eulecanium coryli*): possibilità di trattamento**

## Clima e fasi fenologiche localmente riscontrate



L'evoluzione meteorologica indica che a medio termine non sono previste piogge ma soltanto periodi in cui si alterneranno valori termici al di sotto e al di sopra della media stagionale.


Lo sviluppo delle fasi fenologiche monitorato in questa settimana



evidenzia che pressoché ovunque in pianura (**foto 1**) è stata raggiunta la fase di **rottura gemme (fase C)**.

Nelle zone di media collina invece è prevalente (**foto 2**) la fenofase **C1 (prima e seconda foglia)** ed in quelle anticipate **D (germogliamento terza foglia) (foto 3)**.

## Cocciniglia (*Eulecanium coryli*): possibilità di trattamento



Nelle località con fenofase prevalente **rottura gemme (fase C)** è possibile realizzare, contestualmente alla **batteriosi**, il contenimento della **Cocciniglia (*Eulecanium coryli*)** aggiungendo al **formulato rameico** un prodotto a base di **OLIO MINERALE**.

Nelle località dove risulti previamente la fenofase **C1 (prima e seconda foglia)** è possibile il contenimento della **Cocciniglia** e dell'**inizio migrazione dell'Eriofide** tramite la distribuzione di 50 litri/ha del formulato commerciale Polithiol (**su nocciuolo trattare entro la terza foglia**).