

**PREVISIONI METEO:** clima stabile e mite da diverse settimane su tutto il territorio, previsto peggioramento per il fine settimana e probabilmente anche nel corso della settimana prossima.

## **MELO-INGROSSAMENTO GEMME/PRIME PUNTE VERDI**



### **Cancri rameali-ticchiolatura**

Per trattamento rameico (300 g/ha di s.a.) intervenire prima della pioggia prevista.

### **Cocciniglia di San Josè**

In situazioni particolarmente problematiche, si consiglia di intervenire con Polithiol (50 kg/ha) entro l'emissione degli abbozzi vegetativi.

### **Autonomo del melo**

Monitorare con attenzione la presenza di eventuali individui e laddove necessario procedere con l'intervento a rottura gemme con fosmet.


### **Tentredine**

Programmare l'installazione delle trappole cromotropiche di colore bianco.

### **Cocopsylla melanoeura-vettore degli scopazzi del melo**

Il volo dell'insetto è aumentato significativamente nel corso della scorsa settimana. Nei meleti in cui è presente il problema degli scopazzi, intervenire nei prossimi giorni coi prodotti autorizzati (trebon up 0.75 kg/ha, piretro naturale)

## **PERO-INGROSSAMENTO GEMME**




Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:  
Simone Monge Tel. 3669944390, [monge@confagricuneo.it](mailto:monge@confagricuneo.it)  
Marco Alladio Tel. 3481909455, [alladio@confagricuneo.it](mailto:alladio@confagricuneo.it)

## **Cocciniglia di San José**

Vedi melo

## **DRUPACEE**

### **PESCO:CALICE VISIBILE**



### **Bolla del pesco**

È stata raggiunta la fase di maggiore sensibilità per la bolla del pesco (rottura gemme/calice visibile). Sono state confermate le piogge previste nel fine settimana, si consiglia quindi di trattare prima della pioggia con prodotti specifici per questa avversità (**in questa fase consigliato ziram o captano**).

### **ELENCO PRODOTTI ATTIVI CONTRO LA BOLLA**

Principio attivo	Formulato commerciale	Dose da etichetta g-ml/hl	Dose da etichetta L-KG/ha	Intervallo di sicurezza (gg)	Limitazioni d'uso e consigli applicativi
DODINA	SYLLIT 65 ECC..	80-120	1,38	75	al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dalle avversità
MANCOZEB: attenzione, i prodotti a base di mancozeb scadenza commercio 4/7/2021- scadenza utilizzo 04/01/2022	PENNCOZEB DG	210	2,1	30	Tra Mancozeb,Ziram,Captano al massimo 3 interventi all'anno. Con ZIRAM al massimo 1 intervento all'anno. CAPTANO-MANCOZEB al massimo 2 interventi all'anno
ZIRAM	TRISCABOL DG, ZIRAMIT	200	3	Trattamenti ammessi fino a fine fioritura	
CAPTANO	MERPAN 80 WDG ECC..	300	4,5	21	
ZOLFO (BIO)	THIOPRON	-	9	-	
POLISOLFURO DI CALCIO (BIO)	POLISOLFURO DI CALCIO POLISENIO	2000-5000	16-39	30	Dose che varia a seconda della fase fenologica

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:  
 Simone Monge Tel. 3669944390, [monge@confagricuneo.it](mailto:monge@confagricuneo.it)  
 Marco Alladio Tel. 3481909455, [alladio@confagricuneo.it](mailto:alladio@confagricuneo.it)

### **Cocciniglia bianca**

Se non fatto polithiol nei giorni scorsi, raggiunta la fase di bottoni rosa, intervenire con pyriproxyfen (Juvinal ecc..) con aggiunta di olio minerale (0.5 l\hl).

### **Afide verde**

Trattamento da eseguirsi solo in fase più avanzata (bottoni rosa) ; si consiglia trattamento aficida prefiorale con Teppeki (9 g/hl), soprattutto laddove è stato segnato danno nel corso della passata stagione e nelle zone con focolai di Sharka.

## **SUSINO:BOTTONI FIORALI**



### **Corineo**

Intervenire prima delle piogge previste coi prodotti autorizzati. **Attenzione ai formulati base ziram registrati sulla coltura!**

### **Cocciniglia di San Josè**

Come per il pesco, laddove necessario intervenire con pyriproxyfen (Juvinal) con aggiunta di olio minerale 0.5 l\hl

### **Afidi**

Si consiglia di intervenire con Teppeki prima della fioritura sulle fondatrici.

### **Tripidi**

Nei susinetti con danno alla raccolta nella passata stagione intervenire con un piretroide (lambda-cialotrina) prima della fioritura. Chi esegue il piretroide non farà più l'aficida.

## **ALBICOCCO: BOTTONI SEPARATI-INIZIO FIORITURA**



Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:  
Simone Monge Tel. 3669944390, [monge@confagricuneo.it](mailto:monge@confagricuneo.it)  
Marco Alladio Tel. 3481909455, [alladio@confagricuneo.it](mailto:alladio@confagricuneo.it)

### **MONILIA**

Prima della pioggia programmare una adeguata strategia di difesa (cyprodinil ecc.). Per gli albicoccheti in fioritura attendere l'autorizzazione del SFR prima di intervenire.

### **CILIEGIO:INGROSSAMENTO GEMME**



### **BATTERIOSI-CORINEO**

Se non ancora fatto di recente, programmare un trattamento con prodotti rameici in vista del peggioramento delle condizioni meteo.

### **ACTINIDIA: INGROSSAMENTO GEMME**



### **BATTERIOSI-PSA**

In caso di pioggia, laddove i prodotti rameici dati dopo la potatura sono stati dilavati, effettuare nuovamente trattamento rameico. Altrimenti attendere.

**LIMITAZIONE TRATTAMENTI RAMEICI:** si ricorda che il rame è limitato a 4 kg/ha/anno sui fruttiferi (dose media annuale calcolata in rame metallo; la quantità di rame presente in ogni formulato è diversa a seconda della concentrazione).

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:  
Simone Monge Tel. 3669944390, [monge@confagricuneo.it](mailto:monge@confagricuneo.it)  
Marco Alladio Tel. 3481909455, [alladio@confagricuneo.it](mailto:alladio@confagricuneo.it)