

PREVISIONI METEO: per quanto riguarda le giornate di giovedì 01/04/2021 e venerdì 02/04/2021 il tempo sarà prevalentemente soleggiato con minime di 12° e massime di 24°. Per il weekend Pasquale sono previste precipitazioni su tutta la provincia di Cuneo, con temperature in netto calo. Attendibilità al momento comunque bassa.

MELO-MAZZETTI DIVARICANTI-BOTTONI ROSA



Ticchiolatura

Attendere indicazioni dei prossimi avvisi. Se dovessero confermarsi le precipitazioni, sarà indispensabile intervento di copertura con un SDHI (Fontelis, Luna Experience, Luna Care, Bellis, Sercadis)+ Partner nelle zone molto sensibili all'Oidio (metiram o mancozeb) intervenendo il più possibile vicino alle piogge.

Oidio

Continuare la strategia di difesa secondo i precedenti avvisi.

Cancri rameali

Limitatamente ai meleti colpiti da cancri rameali, entro la fase di pre-fioritura è possibile intervenire con Tiofanate Metile (Enovit metile FL 1,4 l/ha). Si ricorda che questa sostanza attiva è possibile acquistarla **entro e non oltre il 19/04/2021**, mentre il suo utilizzo è consentito **entro e non oltre il 19/10/2021**.


Afide grigio

Si consiglia di intervenire con un prodotto aficida, di seguito i prodotti impiegabili in pre-fioritura. Si ricorda che prima di intervenire con un aficida si deve procedere con lo sfalcio dell'interfila, in quanto non devono esserci fioriture in corso.

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:
Simone Monge Tel. 3669944390, monge@confagricuneo.it
Marco Alladio Tel. 3481909455, alladio@confagricuneo.it

PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE DA ETICHETTA g-mL/hL	DOSE DA ETICHETTA kg-L/ha	INTERVALLO DI SICUREZZA gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
PIRIMICARB	PIRIMOR 50 ecc	50-75	0.76	7	Al massimo 1 trattamento all'anno
TAU-FLUVALINATE (2)	MAVRIK SMART ecc	40-120	0.6	30	(2) Con i PIRETROIDI al massimo 4 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità Al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
ACETAMIPRID (4,67%)	EPIK SL ecc	100-150	2	14	Con ACETAMIPRID al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità
ACETAMIPRID (17,6%)	KESTREL	25-35	0.35		
FLONICAMID	AFINTO ecc	-	0.12-0.14	21	Con FLONICAMID al massimo 2 interventi all'anno indipendentemente dall'avversità, 1 solo contro l'AFIDE GRIGIO
SULFOXAFLOR	CLOSER	-	0.2-0.4	7	Al massimo 2 interventi all'anno (0.2 l/ha ciascuno) senza però superare i 0.4 l/ha/anno (1 solo trattamento a dose massima contro l'afide lanigero)
FLUPYRADIFURONE	SIVANTO PRIME	60-75	0.6-0.9	14	Effettuare 1 trattamento ad anni alterni
AZADIRACTINA (BIO)	NEEMAZAL-T/S ecc	-	2-3	3	Per il numero massimo d'interventi fare riferimento all'etichetta dei vari prodotti

PERO-MAZZETTI DIVARICANTI-INIZIO FIORITURA



Ticchiolatura


Vedi melo. Attendere autorizzazione del SFR per i trattamenti in fioritura.

Colpo di fuoco batterico

Nei pereti colpiti, si consiglia di intervenire con prodotti ad azione antagonista in caso di condizioni climatiche avverse (Serenade Aso, Amylo-X, ecc..).

DRUPACEE

PESCO:FIORITURA-INIZIO CADUTA PETALI



Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:
Simone Monge Tel. 3669944390, monge@confagricuneo.it
Marco Alladio Tel. 3481909455, alladio@confagricuneo.it

Monilia

Prima di intervenire contro questa avversità si dovrà attendere l'autorizzazione del SFR.

Oidio

Nella fase di caduta petali, negli areali più a rischio, programmare una strategia di difesa contro il patogeno.

Cydia molesta

Si conferma l'inizio del volo dell'insetto, procedere con l'applicazione dei dispenser della confusione sessuale.

Bolla del pesco

Nella fase di caduta petali, programmare un trattamento fungicida prima delle piogge (dodina o captano). In alternativa ad esse, il trattamento con Boscalid+Pyraclostroin (Bellis drupacee 0,75 l/ha) svolge funzioni contro Oidio, Monilia e Bolla.

SUSINO:CADUTA PETALI



Corineo

A completa caduta petali si consiglia un trattamento specifico con captano.

Tentredine/afide verde

Laddove nella scorsa stagione sia stato riscontrato il problema, effettuare un trattamento a completa caduta petali con Acetamiprid (Epik sl 2 l/ha).

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:
Simone Monge Tel. 3669944390, monge@confagricuneo.it
Marco Alladio Tel. 3481909455, alladio@confagricuneo.it

ALBICOCCO: ALLEGAGIONE



Oidio/corineo

Fase molto sensibile , si consiglia l'applicazione di Boscalid+Pyraclostrobin (Signum, Bellis Drupacee 0,75 l/ha).

Afide farinoso

Se non ancora fatto, intervenire con uno dei p.a. indicati Acetamiprid, Primicarb, Tau-Fluvalinate, Piretrine.

CILIEGIO: COROLLA VISIBILE-FIORITURA



Monilia

Nelle varietà più sensibili, programmare una strategia di difesa, attendere comunque autorizzazione del SFR per le varietà in fioritura.

Afidi

Prima della fioritura, intervenire con aficida (consigliato taufluvalinate).

ACTINIDIA: ROTTURA GEMME-PRIME FOGLIOLINE



Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:
Simone Monge Tel. 3669944390, monge@confagricuneo.it
Marco Alladio Tel. 3481909455, alladio@confagricuneo.it

Batteriosi da PSA

Se confermate le piogge previste, si consiglia un trattamento rameico (15-20 g/hl di s.a.). Per l'applicazione di induttori di resistenza (Bion) attendere prossimi avvisi.

Per info e chiarimenti contattare il Servizio Tecnico Confagricoltura Cuneo ai seguenti recapiti:
Simone Monge Tel. 3669944390, monge@confagricuneo.it
Marco Alladio Tel. 3481909455, alladio@confagricuneo.it