

**Info Flash n. 1
Del 29/03/21**

NOCCIOLO



Coordinamento corilicolo Piemontese

Aggiornamento

Eriofide: intervenire nelle zone anticipate e ben esposte

Clima mite tra martedì e venerdì con temperature sulla soglia dei 24-25°C. La tendenza verso il **fine settimana** è comunque rivolta ad un generale **peggioramento**, con arrivo di aria più fresca ed instabile, associata a piogge e acquazzoni.

ERIOFIDE: INTERVENIRE NELLE ZONE ANTICIPATE

Nelle **zone anticipate e ben esposte** si segnala la **migrazione dell'eriofide galligeno**. Si consiglia pertanto in tale zone, l'effettuazione al più presto **del primo trattamento** mirato al contenimento del fitofago.

Nelle altre zone, dove i nocciolati evidenziano una fase di germogliamento **ancora indietro** e dove le galle sono ancora chiuse, si consiglia di proseguire i monitoraggi e **restare in attesa del prossimo bollettino**.

I principi attivi consigliati dal Disciplinare di Produzione Integrata per il controllo dell'eriofide *Phytoptus avellanae*, sono riportati nella tabella sottostante.

AVVERSITA'	PRINCIPIO ATTIVO	FORMULATO COMMERCIALE	DOSE g-mL/hL	DOSE kg-L/ha	CARENZ A gg	LIMITAZIONI D'USO E CONSIGLI APPLICATIVI
ERIOFIDE GALLIGENO	CLOFENTEZINE	APOLLO SC	40	0,4	50	Al massimo 1 intervento all'anno
	ZOLFO	THIOPRON, TIOVIT L ecc	varia	varia	-	-