

Info n. 8

Del 31/03/21

NOCCIOLO



Coordinamento corilicolo Piemontese

Aggiornamento

Situazione fenologica

Eriofide: Iniziata migrazione in versanti più esposti (vedere info flash 1)

Tutela dei pronubi

Diserbo: prestare attenzione alle miscele impiegate sulla fila

Aggiornamento scatole svernamento cimice asiatica

La settimana è trascorsa con temperature diurne prossime ai 20° per via dell'invasione di aria calda origine afro mediterranea interessa l'Europa centro-occidentale che fino a sabato manterrà da noi tempo pienamente primaverile. Tra sabato sera e domenica una corrente di aria più fredda tenderà a portarsi sulla Pianura Padana con correnti che favoriranno qualche rovescio e un calo delle temperature.

SITUAZIONE FENOLOGICA

Nella settimana dal 23 al 31 marzo, la situazione fenologica si è evoluta in molte zone per effetto del caldo. In altre zone le temperature notturne e delle prime ore del mattino ancora basse hanno rallentato lo sviluppo delle nuove foglioline.



Cravanzana - Az. Nasio 29/03/2021



Diano d'Alba -29/03/2021

ERIOFIDE: SITUAZIONE DIFFERENTE A SECONDA DELLE ZONE

Trattamenti in corso in molte aziende dove è stata segnalata l'avvio della migrazione dell'acaro (vedere info flash n.1).

La migrazione dell'eriofide si verifica quando le temperature massime giornaliere risultano essere > 15°C e le temperature medie < 9°C. In alcune aree meno anticipate e soleggiate di alessandrino, astigiano e alta langa non sono ancora stati raggiunti i valori indicati pertanto, anche questa settimana, proseguiranno i monitoraggi per poter posizionare il trattamento al momento più idoneo.

Di seguito alcune precisazione sulle formulazioni di zolfo disponibili

•Gli zolfi per trattamenti liquidi, dotati di particelle più fini, sono più efficaci dei corrispondenti polverulenti impiegati a dosaggi più elevati anche se questi ultimi, distribuiti con macchine

solforatrici formano una fitta cortina in grado di penetrano maggiormente all'interno della vegetazione.

•Con l'aumento della temperatura si ha maggior sublimazione delle particelle di zolfo perciò è bene evitare di effettuare i trattamenti nelle ore più calde e soleggiate della giornata.


•Si sconsiglia di utilizzare lo zolfo dopo una pioggia perché la sua attività diminuisce con l'aumento dell'umidità relativa dell'ambiente.

TUTELA DEI PRONUBI

Nel caso del nocciolo con fioritura invernale occorre fare attenzione ai trattamenti effettuati in primavera in concomitanza con la fioritura di altre colture (es. *Tarassacum officinalis*, *Lamium purpurea* ecc.)

Alcune indicazioni utili a protezione dei pronubi:

- sfalcio interfilari per evitare che le api siano attratte da fioriture di erbe spontanee.
- effettuare trattamenti alla sera, dopo il tramonto: in quel momento le api si ritirano negli alveari.



DISERBI: ATTENZIONE ALLE MISCELE

Le aziende stanno in questi giorni effettuando i trattamenti di diserbo sulla fila. Si ribadisce di **prestare attenzione all'impiego di miscele che prevedano l'impiego di prodotti sistemici** (es. s.a.glifosate) **con prodotti ad azione dicotiledonica** (es. s.a.pyraflufen-etile o s.a.carfentrazione etile). **Non impiegare miscele di questo genere per spollonatura**: il prodotto sistemico entrando in contatto con i polloni potrebbe essere traslocato all'interno della piante causando un effetto fitotossico.

AGGIORNAMENTO SCATOLE DI SVERNAMENTO CIMICE ASIATICA

Le indicazioni provenienti dalle postazioni / teche di svernamento, indicano complessivamente, nella tredicesima settimana (**29/03/2021 - 04/04/2021**), una **fuoriuscita di adulti di cimice asiatica** pari al 15,87%.