

3

Comunicato Per La Difesa In Viticoltura  
Difesa Integrata Volontaria VITE

3

VINCOLATA AL QUADRO DELLE NORME TECNICHE DELLA MISURA 10.1.1 DEL PSR

CentroAssistenzaTEcnica LANGHE ROERO DOGLIANI MONREGALESE  
2021 Del 19 Maggio ore 13 2021

**Situazione**

Prosegue un regime primaverile molto scarso di precipitazioni (70-85 mm dal 1 marzo ) e tendenzialmente freddo(minime prossime ai 10°C fino a lunedì). Riscontri di sintomi dei patogeni assolutamente sporadici. Grandissima disomogeneità nello sviluppo vegetativo in campo. Non sono previste precipitazioni di rilievo per tutta la prossima settimana (con ipotesi previsionale discordante solo su lunedì 24)

**OIDIO. Uncinula necator.**

TRA GIOVEDÌ E SABATO 22 MAGGIO

Utilizzare in difesa formulati commerciali a base di **Zolfo**.

Esclusivamente nei siti più precoci e situazioni di vigneti più avanti nella fase fenologica (prossimità di inizio della fioritura)

è possibile ricorrere a: **\*FAMIGLIA/GRUPPO: IBE** (3 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) :

FLUTRIAFOL-MICLOBUTANIL-DIFEN/TEBU/CONAZOLO (TUTTI 1 trattamento/MASSIMO/ANNO).

FENBU/PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 TRATTAMENTI/MAX/ANNO). L'ASSOCIAZIONE DI ZOLFO BAGNABILE A

QUEST'ULTIMI (SE NON GIÀ FORMULATI CON ESSO) è COMUNQUE UTILE E CONSIGLIATA IN CHIAVE ANTIRESISTENZA

**PERONOSPORA. Plasmopara viticola.**

UTILIZZARE FORMULATI COMMERCIALI CONTENENTI: **\*FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA** (4 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO) : MANCOZEB (3 TRATT. MAX FINO ALLEGAGIONE), DITHIANON (3 TRATT. MAX FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM (3 TRATT. MAX)) FOLPET (3 TRATT. MAX). METIRAM(3 TRATT. MAX SE DA SOLO, FINO ALL'ALLEGAGIONE). EVENTUALMENTE AD ESSI (NELLE SITUAZIONI DI MAGGIOR SVILUPPO VEGETATIVO) ASSOCIARE:**\*FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI** (8 TRATTAMENTI COMPLESSIVI/MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFONATO DI POTASSIO(5MAX), FOSFONATO DI DISODIO (6MAX).

CONSULTARE IL PROPRIO TECNICO PER ULTERIORI VALUTAZIONI

ATTENZIONE ALLA NUOVA DICITURA RIPORTATA NELLA PARTE GENERALE DELLE NORME TECNICHE DI DIFESA VITE:

**Nelle miscele estemporanee di fungicidi (compreso combi pack) non sono impiegabili più di due sostanze attive diverse contemporaneamente per ciascuna avversità. Da questa limitazione vanno esclusi i prodotti rameici, lo zolfo, i Fosfonati di K, il Fosfonato di disodio, il Fosetil Al e tutti i prodotti biologici.**