

COMUNICATO
NR

8

27 mag 24



CONFEDERAZIONE ITALIANA
AGRICOLTORI
Associazione provinciale di CUNEO



UNIONE PROVINCIALE
AGRICOLTORI CUNEO

NR

8

27 mag 24

SERVIZIO TECNICO DIFESA INTEGRATA VOLONTARIA VITE Norme Tecniche del CSR Piemonte SRA01 Aca1

SITUAZIONE

Settimana scorsa gli apporti di pioggia temporaleschi sono stati, nel complesso, molto più contenuti di quanto ipotizzato dalle previsioni. Evento grandinigeno venerdì nel sud astigiano. La fioritura procede molto lentamente, per rappresentanza lampante, nelle posizioni meglio esposte di Nebbiolo. Appena in esordio nella stragrande maggioranza degli altri vitigni. Attività temporalesca prevista in ripresa negli ultimi giorni della settimana

PERONOSPORA (Plasmopara viticola)

RISCHIO

LA PROGRESSIONE DELLA SINTOMATOLOGIA IN VIGNETO, IN SITUAZIONI 'SPIA' (VIGNETI NON ADEGUATAMENTE TRATTATI O CON TEMPISTICHE NON CONSONE ALLE FREQUENZE RICHIESTE), È, PER ORA, SOLTANTO "DISCRETA". QUESTO NON DEVE INDURRE ASSOLUTAMENTE AD ABBASSARE LA GUARDIA NEL MOMENTO CHE SI PROFILA PIÙ DELICATO IN ASSOLUTO *SITUAZIONE IN NETTA EVOLUZIONE PEGGIORATIVA INVECE NEI TESTIMONI DI RIFERIMENTO NON TRATTATI

SI CONSIGLIA DI EFFETTUARE IL PROSSIMO TRATTAMENTO

ENTRO

GIOVEDÌ

30 MAGGIO

IN ANTICIPO SUL PASSAGGIO TEMPORALESCO PREVISTO A SEGUIRE NEL FINALE DELLA SETTIMANA

SI CONSIGLIA DI UTILIZZARE **NEL RISPETTO DEGLI INTERVALLI MINIMI INDICATI IN ETICHETTA!**

LE S.A. DI SEGUITO ELENCALE IN FORMAZIONE ESTEMPORANEA TRA LORO OPPURE NEI FORMULATI COMMERCIALI (FC) CHE GIÀ LE CONTENGONO

NB :TRA PARENTESI IL NUMERO MAX DI TRATT./ANNO TOTALI DEL GRUPPO O, SE LA SEGUE, DELLA SOSTANZA ATTIVA (S.A.) SPECIFICA. SENZA LIMITE= SL

1***FAMIGLIA/GRUPPO: ALTRI COPERTURA (4 TRATTAMENTI TOTALI/MAX/ANNO: TRA DITHIANON (4) FINO ALLEGAGIONE), FLUAZINAM(4), FOLPET(4). CASO A SE METIRAM (3, SE DA SOLO, FINO AD ALLEGAGIONE)

*****RICHIESTA DEROGA PER AUMENTO DEL NUMERO MASSIMO DI TRATTAMENTI DI TALE GRUPPO. SENTIRE I PROPRI REFERENTI TECNICI!**

3***FAMIGLIA/GRUPPO: INDUTTORI SISTEMICI: (8 TRATTAMENTI COMPLESS./MAX/ANNO): FOSETYL AL(SL); FOSFITO DI POTASSIO(5MAX), FOSFO.TO DI DISODIO(6MAX).

4***FAMIGLIA/GRUPPO: CAA (4 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO. DOPO 3 USI CONSECUTIVI, OBBLIGO ALTERNARE S.A. DI ALTRO GRUPPO): DIMETOMORF(4),

5***FAMIGLIA/GRUPPO: FENILAMMIDI: (3) : BENALAXYL-M (3),METALAXYL-M (3). METALAXIL REINTRODOTTO (2 TRATTAMENTI MAX ASSIEME A FLUOPICOLIDE)

6***FAMIGLIA/GRUPPO: Qil (3): CIAZOFAMIDE (3), AMISULBROM (3, MA NON PIÙ DI 2 CONSECUTIVI SE USATO DA SOLO)

ALTRE S.A "SINGOLE" 8*** ZOXAMIDE*** (4) 9***AMETOCTRADINA*** (QoS) (3).

11***OXATHIPIPROLIN*** (2MAX SEMPRE IN MISCELA)

12***FLUOPICOLIDE*** (2) (2MAX CON METALAXIL)

DIFESA BIOLOGICA

NELLA DIFESA BIOLOGICA SI RACCOMANDA LA SCELTA DI FORM.TI RAMEICI OPPORTUNI A MAGGIOR PRONTEZZA O PERSISTENZA A SECONDA DELLA SITUAZIONE UTILIZZANDO IL MINIMO APPORTO DI RAME POSSIBILE SEMPRE IN ANTICIPO SU PIOGGE E CON INTERVALLI CONSEQUENTI AI DILAVAMENTI

2***FAMIGLIA/GRUPPO: COPERTURA RAMEICI' (28 KG RAME METALLO IN 7 ANNI- con riferimento medio a 4 kg/ettaro/anno. Limite massimo annuo di 5 kg.

OIDIO (Uncinula necator)

RISCHIO

PROSEGUE CONTENUTO IL RISCONTRO DI SINTOMI FOGLIARI DEL PATOGENO. IN RELATIVO AUMENTO QUELLI DI BLACK ROT. ATTENZIONE AI CICLI INFETTIVI DI QUESTO PATOGENO CHE HANNO TEMPI DI INCUBAZIONE MOLTO LUNGI. DISCRETI RISCONTRI SU BARBERA IN PARTICOLARE ED ALTRI VIT. INTERNAZIONALI DI SINTOMI DI MUFFA GRIGIA

ASSOCIARE ALL'ANTIPERONOSPORICO UNO DEI SEGUENTI PRINCIPI ATTIVI AVENTI SIMILE PERSISTENZA

0

4***FAMIGLIA/GRUPPO: IBE(3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : MEFENTRIFLU / PEN/ TETRA-CONAZOLO (TUTTI 3 MAX). DIFENO / TEBU - CONAZOLO (1 AL MAX IN ALTER.TIVA)

5***FAMIGLIA/GRUPPO: STROBILURINE (3 TRATT.TOTALI /MAX/ANNO ANCHE ASSIEME A ANTIPERONOSPORICO PYRACLOSTROBIN(3) : AZOXY (2)/TRIFLOXY-STROBYN

9***CIFLUFENAMID(2 T/MAX)

NEI VIGNETI PIÙ AVANZATI NELLA FIORITURA CONSIDERARE INOLTRE:

6***FAMIGLIA/GRUPPO: "CMR" (2 TRATT. TOTALI /MAX/ANNO): PROQUINAZID (2), BUPIMIRATE (2), PYRIOFENONE(%%) (2)

7***FAMIGLIA/GRUPPO: ARYL-FENIL-CHETONI (3 TRATT. TOTALI/MAX/ANNO) : METRAFENONE (3); PYRIOFENONE(%%) (2MAX)

DIFESA BIOLOGICA. ASSOCIARE AI RAMEICI PRODOTTI A BASE DI ZOLFO BAGNABILE E/O BICARBONATO DI POTASSIO.

EVENTUALMENTE ASSOCIATI A

10***ALTRE SOSTANZE/AGENTI ATTIVE/I BIOLOGICI :

E/O SPECIFICI PRODOTTI MICROBIOLOGICI

Da usare ANCHE in caso di bassa pressione e/o in rinforzo ai 'tradizionali'. Rispettare le indicazioni di etichetta. Non concorrono a raggiungere il numero Max di interventi/avversità.

ALTRI CONSIGLI TECNICI

VALUTARE IL PROSEGUIMENTO DI LINEE FERTILIZZANTI FOGLIARI A BASE DI ALGHE/ALTRE FORMULAZIONI (MICROELEMENTI) IN SUPPORTO ALLA FIORITURA

PER ACCURATE VALUTAZIONI CONTATTARE SEMPRE IL PROPRIO SERVIZIO TECNICO

BOLLETTINO EMESO A CURA DI VIGNAIOLI PIEMONTESI

TUTTE LE INDICAZIONI SUI, PRINCIPI ATTIVI, AVVERSITÀ VERSO LE QUALI SONO REGISTRATI, LIMITAZIONI - DOSAGGI DEGLI STESSI, CONTENUTE NEI BOLLETTINI SONO SEMPRE DA VERIFICARE. INOLTRE NON POSSONO ESSERE ESAUSTIVE DELL'INTERO PANORAMA DISPONIBILE SUL MERCATO. OGNI VITICOLTORE È LIBERO DI FARE SCELTE ALTERNATIVE. È INOLTRE SEMPRE SUO DOVERE E RESPONSABILITÀ ESCLUSIVA, ATTENERSI ALLE INDICAZIONI VINCOLANTI RIPORTATE SULLE ETICHETTE CHE REGOLANO L'USO DEL PRODOTTO FITOSANITARIO (IN PARTICOLARE PER LA TOSSICOLOGIA, DOSAGGI, AVVERSITÀ TARGET E BUONE NORME DI SICUREZZA-RISPETTO AMBIENTALE).