

**Info n. 6**

**Del 10/04/2024**



## **AGGIORNAMENTO TECNICO**

**ANDAMENTO CLIMATICO**

**SITUAZIONE FENOLOGICA**

**ERIOFIDE**

**COCCINIGLIA**

**MAL DELLO STACCO e AGRILO**

**BATTERIOSI**

**Raccomandazioni su: CONCIMAZIONI FOGLIARI, DISERBO e**


**INTERVENTI POST NEVICATE TARDIVE**

## ANDAMENTO CLIMATICO

La parentesi di caldo tardo-primaverile sviluppatasi nel fine settimana è stata interrotta martedì, per il transito di una saccatura depressionaria atlantica, determinando un primo passaggio piovoso al quale ne seguirà un secondo dal pomeriggio di oggi. Da giovedì l'alta pressione riprenderà il sopravvento con un nuovo contributo di aria calda subtropicale. Fine settimana soleggiato con caldo tardo-primaverile e temperature fin oltre i 25 gradi e sui 17 gradi a 1500 metri.

La prossima settimana temperature in calo e massime sui 16/18 gradi dal 16 aprile (7/9 gradi a 1500 metri).

In figura 1 la situazione meteo registrata presso la Stazione di Cravanzana (CN). Le temperature massime giornaliere comprese tra gli 8,1 e 26,7°C, medie comprese tra i 3,5 e 16°C e minime tra i -0,9 e 8,6°C. Precipitazioni totali raggiunte da inizio gennaio 438,8 mm.



## SITUAZIONE FENOLOGICA

A livello regionale ci ritroviamo mediamente allo stadio di 4-5<sup>a</sup> foglia, con qualche situazione più o meno difforme nelle zone tardive ed anticipate.

Tabella 1. Fasi fenologiche del nocciolo per provincia

Provincia	Fase ciclo vegetativo	BBCH
Alessandria	4-5 <sup>a</sup> foglia	14
Asti	4-5 <sup>a</sup> foglia	14
Cuneo	tra 3 <sup>a</sup> e 4-5 <sup>a</sup> foglia	13-14
Torino	4-5 <sup>a</sup> foglia	14



## MONITORAGGIO ERIOFIDE

Le forme mobili dell'acaro risultano mediamente ad inizio migrazione, in funzione dell'abbassamento delle temperature **si consiglia di proseguire il monitoraggio visivo in attesa della piena migrazione**. Nelle località anticipate, laddove si fosse in piena migrazione contattare il proprio tecnico al fine di valutare epoca e tipologia d'intervento.



3 <sup>a</sup> FOGLIA (D) BBCH 13	ERIOFIDE GALLIGENO ( <i>Phytoptella avellanae</i> )	CLOFENTEZINE	APOLLO SC	40	0,4	50	Al massimo 1 intervento all'anno <b>Impiegabile fino all'11 novembre 2024</b>
		ZOLFO	THIOPRON, TIOVIT ecc.	varia	varia	-	
4 <sup>a</sup> - 5 <sup>a</sup> FOGLIA (D1) BBCH 14							

## COCCINIGLIA

Si consiglia di effettuare i monitoraggi dove è stata riscontrata la presenza del fitofago, concentrandosi sulle porzioni apicali dei nuovi rametti e nelle zone in prossimità delle gemme.

Laddove vi fosse una forte infestazione, contattare il proprio tecnico al fine di valutarne la modalità di gestione.



## RIMOZIONE DEI RESIDUI COLPITI DA *Cytospora* e Agrilo

Per prevenire e contenere la diffusione di alcune avversità, *Cytospora* in primis (data la forte presenza riscontrata in campo nella pregressa stagione), non appena verranno concluse le operazioni di potatura **si consiglia di provvedere alla rimozione dei residui**.

Si ricorda che è opportuno proteggere con mastici o paste cicatrizzanti addizionati con prodotti a base di rame i tagli di potatura effettuati sulle pertiche superiori ai 5 cm diametro.

Si rammenta che **dal 15 settembre 2023 e fino al 15 aprile 2024, sull'intero territorio della Regione Piemonte vige il divieto di abbruciamento di materiale vegetale** come previsto dalle disposizioni straordinarie per la qualità dell'aria del D.G.R. n. 9-2916 del 26 febbraio 2021.

## BATTERIOSI

Ove sia necessario contenere gli attacchi della batteriosi si consiglia di contattare il tecnico di riferimento per concordare sia periodo che strategia da adottare.

## CONCIMAZIONI FOGLIARI

Al fine di permettere un maggior assorbimento dei prodotti da parte delle piante, per le fertilizzazioni fogliari sia con che senza microelementi (B, Zn e Mn), si consiglia di attendere una maggior copertura fogliare delle piante.

## DISERBO

Per l'utilizzo del **glifosate** si consiglia vivamente di leggere e far riferimento alle varie etichette, onde aver problematiche successive nella compilazione dei quaderni di campagna, in quanti alcuni prodotti riportano come limitazione 1 solo trattamento.

## NEVICATE TARDIVE

Laddove vi siano state neviccate tardive che hanno procurato rotture di pertiche e rami si consiglia, appena è possibile l'ingresso in appezzamento, di effettuare trattamenti di copertura con miscele di Rame e Zolfo al fine di disinfettare le ferite e gestire l'eriofide.

### PRODOTTI COMMERCIALI GIA' IN MISCELA:

- CUPRIZOL
- CUPRIZOL S
- RAME ZOLFO FLOW MCT

**Per le MISCELE di Rame e Zolfo leggere attentamente le etichette per conoscerne la loro compatibilità o meno.**