

Info n. 20

Del 27/09/2023



## **AGGIORNAMENTO TECNICO**

**ANDAMENTO CLIMATICO**

**SITUAZIONE FENOLOGICA e POST RACCOLTA**

**CIMICI e CIMICE ASIATICA**

**MAL DELLO STACCO (*Cytospora corylicola*): elevata presenza**

**BATTERIOSI e GLEOSPORIOSI: presenza**


**OIDIO e OIDIO TURCO: presenza in chioma**

## ANDAMENTO CLIMATICO

Domina l'alta pressione per tutta la settimana con tempo soleggiato e temperature in graduale aumento.

Probabile evoluzione sul lungo periodo, nel fine settimana vi sarà un ulteriore rafforzamento dell'alta pressione con un contributo di aria calda dal Nord Africa. Probabile qualche annuvolamento dal 3 ottobre con temperature comunque oltre la norma stagionale, con massime tra 25 e 28 gradi.

In figura la situazione meteo registrata presso la Stazione di Cravanzana (CN). Le temperature medie comprese tra i 13,6 e 21,5°C, minime tra i 6 e 15,9°C e massime giornaliere tra i 21,1 e 33,3°C. Precipitazioni 24 mm (da inizio settembre). Totale mm precipitati da ottobre 632,2 mm.



## SITUAZIONE FENOLOGICA e RACCOLTA

Su tutto il territorio, tranne che in casi sporadici, si sono concluse le operazioni di raccolta anche nelle aree meno anticipate.

Sono in corso le valutazioni su produzione/ettaro e sulla resa allo sgusciato (%).

## AGGIORNAMENTO CIMICI

Con le temperature di fine settembre più alte rispetto alle medie stagionali, si assiste alla formazione di raggruppamenti di cimici, asiatiche e non, sia negli appezzamenti in pianta che in prossimità delle zone di svernamento (edifici, magazzini, aziende...).

## SEGNALAZIONI DI: *Cytospora corylicola*, Batteriosi e Gleosporiosi

### *Cytospora corylicola*

Programmarne il controllo e la gestione nel post raccolta mediante adeguate potature ed eliminazione del legno infetto/colpito.

Individuare la presenza di rami che presentano i cirri di propagazione del fungo (gocce gommose rosse) e quelli che sono dissecati al fine di procedere alla loro asportazione durante la potatura. E' opportuno proteggere con mastici o paste cicatrizzanti addizionati con prodotti a base di rame i tagli o le ferite più ampie e profonde (superiore ai 5 cm).



In questa fase **SI RACCOMANDA** la potatura del solo materiale vegetale **SECCO** e la sua rimozione dal nocciolo, si rimandano le operazioni di potatura di produzione a dopo il periodo invernale.

Si ricorda che vige: "Il divieto di abbruciamento di materiale vegetale, su tutto il territorio regionale, dal 15 settembre 2023 al 15 aprile 2024 (Norme in materia ambientale)".

## BATTERIOSI

Programmare gli interventi con prodotti rameici.

Indicazioni sul ciclo di interventi consigliati:

- tagliare e asportare i rami colpiti durante le operazioni di potatura;
- in autunno a partire dall'inizio della caduta foglie e in caso di attacco grave effettuare 2 trattamenti (inizio e fine caduta foglie);
- in caso di attacco lieve, intervenire con 1 trattamento alla caduta foglie;
- effettuare i trattamenti con prodotti a base di rame o in miscela con la s.a. acibenzolar-S-metile;
- si utilizzasse la s.a. acibenzolar-S-metile (dotato di attività sistemica) anticipare l'intervento prima della caduta foglie.

Per la s.a. Acibenzolar-S-metile sono ammessi 4 interventi/anno e per la s.a. rame massimo 12 kg/ettaro per il triennio 2022-2024 e comunque non più di 5 kg/ettaro in un anno.

## SEGNALATA PRESENZA DI OIDIO (*P. corylicola*) e OIDIO TURCO (*E. corylacearum*)

Segnalazioni del nuovo oidio (*E. corylacearum*) diffuse nell'intero areale piemontese, il nuovo oidio si riscontra localizzato sia sui polloni che in chioma di piante adulte.

Data l'elevata presenza nel corso della stagione e nell'ultimo periodo, si invitano le aziende che riscontrassero tale problematica nei propri appezzamenti a segnalarlo al proprio tecnico di riferimento, per valutare un intervento con zolfo in modo tale da ridurre l'inoculo per la prossima campagna.

